15 QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA

01-_____ é considerado por muitos como o herói fundador da Epidemiologia por pautar a nascente metodologia epidemiológica. Em investigação sobre a cólera de 1850, ele antecipou uma demonstração da teoria microbiana antes mesmo de Pauster. Assinale, das alternativas abaixo, a que completa corretamente a lacuna.

A. John Snow.
B. Rudolf Virchow.
C. Edwin Chadwick.
D. Pierre-Charles.
E. René Villermé.

02-No modelo biomédico de patologia pode-se afirmar que:

A. As doenças infecciosas são definidas por exclusão.
B. Todos agentes infecciosos das doenças não-infecciosas são de natureza inanimada.
C. Abuso de drogas, acidentes, violência são incluídos na categoria de enfermidades não-infecciosa.
D. Úlcera gástrica, doença de Hodgkin e leucemia são doenças exclusivamente não-infecciosas.
E. Toda doença contagiosa é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa.

03-No modelo de Saúde-Doença, as relações do hospedeiro com o bioagente patogênico podem ser descritas pelas seguintes categorias:

A. Resistência, suscetibilidade e imunidade.
B. Imunogenicidade, patogenicidade e resistência.
C. Infectividade, suscetibilidade e resistência.
D. Biopatogenicidade, suscetibilidade, imunidade.
E. Cronicidade, resistência, patogenicidade.

04-"É o sistema de defesa com o qual o organismo impede a difusão ou multiplicação de agentes infecciosos que o invadiram, ou reage aos efeitos nocivos dos seus tóxicos". Esta é a definição de:

A. Resistência
B. Imunidade
C. Cronicidade
D. Imunogenicidade
E. Infectividade

05-A leishmaniose visceral é um tipo de:

A. Anfixenoses
B. Antroponoses
C. Zoonoses
D. Antropozoonoses
E. Zooantroponoses

06-Das alternativas abaixo, assinale a que indica um exemplo de fitonose:

A. Febre titfóide
B. Arbovirose silvestre
C. Arbovirose fitogênica
D. Leshimaniose visceral
E. Blastomicose sul-americana

07-A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente da dengue no Brasil ocorreu em:

A. 1979-1980, em Luará - Pará, causada pelos sorotipos 1 e 3.
B. 1981-1982, em Boa Vista - Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4.
C. 1983-1984, em Diadema – São Paulo, causada pelos sorotipos 1 e 2.
D. 1989-1990, no Rio de Janeiro – Rio de Janeiro, causada pelos sorotipos 2 e 3.
E. 1986-1987, em Cabrobó - Pernambuco, causada pelos sorotipos 1 e 4.

08-No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola – CEV é reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na estrutura das secretarias estaduais de saúde. Esta campanha se deu em:

A. 1957-1965
B. 1966-1973
C. 1968-1977
D. 1977-1981
E. 1962-1969

09-Nas doenças infecciosas, os objetos contaminados que servem como meio de transmissão recebem o nome de:

A. Agressores
B. Fômites
C. Invasores
D. Introdutores
E. Patogênicos

10-Sobre a Lei Eloy Chaves é INCORRETO afirmar:

A. Foi aprovada em 1923.
B. É considerada marco inicial da previdência social no Brasil.
C. Política de saúde: Instituíram-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP's) que deveriam ser organizadas por empresas.
D. Para o operário urbano criou-se socorros médicos, medicamentos por preços baixos, aposentadoria, pensão para herdeiros em caso de morte.
E. Na década de 60 criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs).

11-As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar, EXCETO:

A. Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito.
B. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

C. Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania.
D. Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania no SUS.
E. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso único nas ações e serviços de saúde, de acordo com a Constituição.

12-Um dos sistemas mais relevantes para a atenção básica é o: Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) que é utilizado pela atenção básica, é um sistema que permite agregar e processar informações sobre a população visitada. No entanto, parte dos seus instrumentos pode ser usada por outros modelos de atenção. O sistema pode fornecer as seguintes informações, EXCETO:

A. Notificações.
B. Número de gestantes adolescentes cadastradas.
C. Captação de adolescentes gestantes, por trimestre, para o pré-natal.
D. Óbitos de adolescentes por causas externas (incluindo mortes violentas).
E. Sistema de Gerenciamento da Unidade Emergencial Básica (Sigeb).

13-Quanto a Regionalização é INCORRETO afirmar:

A. Organização dos serviços de saúde em cada região para que a população tenha acesso a todos os tipos de atendimento.
B. É uma das diretrizes que orientam a organização do SUS.
C. Representa a articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados.
D. Garante acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população.
E. Visa imprimir maior eficácia, eficiência e equidade ao sistema através de maior racionalização no uso dos serviços de saúde, a ser alcançada através da organização e articulação regional da oferta e do acesso aos serviços em seus diferentes níveis de complexidade.

14-Sobre a Reforma Sanitária é INCORRETO afirmar:

A. O movimento da Reforma Sanitária representou uma mudança de paradigma na saúde pela abrangência dos determinantes sociais no processo saúde e doença.
B. Se deu na construção do paradigma denominado medicina social ou saúde coletiva, organizado a partir das noções de determinação social do processo saúde-doença.
C. Na saúde, nos anos 70, o movimento de Reforma Sanitária contribuiu na implantação do Sistema Único de Saúde, que visava assegurar, através de seus princípios, os direitos sociais.
D. O processo da Reforma Sanitária brasileira acabou por desembocar na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), e permitiu que a afirmativa contida em seu relatório final assegurando a saúde como direito de todos e dever do Estado fosse incorporada pela constituinte na Constituição Federal Brasileira de 1988.
E. O acesso à saúde como direito de cidadania foi regulamentado pela Lei n. 8080 de 1990 e pela Lei n. 8142, do mesmo ano, que determinou a participação e o controle da comunidade, e o repasse de recursos. Desde então, a saúde teve vários avanços.

15-São atribuições do SUS (art. 200, CF/ 1988), EXCETO:

A. Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
B. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador.
C. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
D. Incrementar desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.
E. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16-São produtos teciduais responsáveis por reações inflamatórias, EXCETO:

A. Histamina.
B. Bradicinina.
C. Serotonina.
D. Prostaglandinas.
E. Linfoquinas liberadas por células B sensibilizadas.

17-A descrição clássica da síndrome dos ovários policísticos (SOP) inclui os seguintes sinais, EXCETO:

A. Hirsutismo.
B. Obesidade.
C. Hiperandrogenemia.
D. Elevação predominante do LH em relação ao FSH.
E. Febre recorrente.

18-São fatores de risco para diabetes gestacional, EXCETO:

A. Deposição central excessiva de gordura corporal.
B. Baixa estatura (≤ 1,51cm).
C. Poliidramnio.
D. Hipertensão.
E. Preeclâmpsia na gravidez atual ou anterior.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

19-São contra-indicações absolutas para a prática de atividade física na gravidez, EXCETO:

A. Pré-eclâmpsia ou hipertensão induzida na gravidez.
B. Ruptura prematura de membranas ou ameaça de trabalho de parto prematuro.
C. Incompetência istmo cervical ou cerclagem na gravidez atual.
D. Sangramento no segundo ou no terceiro trimestre.
E. Gestação gemelar com mais de 28 semanas.

20-Sobre vacinação é INCORRETO afirmar:

A. Vacina contra Hepatite B: o intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose é de 30 dias, entre a 2ª e a 3ª doses é de 60 dias, e entre a 1ª e a 3ª é de 90 dias. Não existe intervalo máximo entre as doses.
B. Vacina contra H. influenzae b: se aplicada acima de 1 ano de idade, deve ser em dose única.
C. DPT: a idade máxima para sua aplicação é de 6 anos, 11 meses e 29 dias. O reforço com dupla adulto (dT) deve ser feito de 10 em 10 anos, a partir do segundo reforço da DPT.
D. Triviral ou Dupla viral: uma nova dose deverá ser aplicada em campanhas antes dos 5 anos de idade.
E. Vacina contra Febre Amarela: pode ser aplicada a partir de 6 meses de vida em área de circulação de risco.

21-Sobre as manifestações clínicas e laboratoriais que sugerem presença de infecção em pacientes queimados é INCORRETO afirmar:

A. Hipertermia > 38°C.
B. Hipotermia < 36°C.
C. Invasão de tecidos queimados.
D. Trombocitopenia.
E. Azotemia não explicada.

22-Sobre a transmissão da hepatite viral do tipo B é INCORRETO afirmar:

A. A tatuagem e o uso de complexos vitamínicos por meio de equipamentos não descartáveis e compartilhados são formas importantes de transmissão em nosso meio.
B. O HBV é um vírus resistente, podendo sobreviver pelo menos sete dias no ambiente.
C. O HBV pode resistir durante 10 horas a 60ºC, durante 5 minutos a 100ºC, ao éter e ao álcool a 90º e permanecer viável após vários anos de congelamento.
D. A contagiosidade do HBV em relação a outras viroses de transmissão parenteral é muito mais elevada.
E. O HBV tem sua resistência pouco definida até o momento, mas sabe-se que ele é mais lábil que o vírus C.

23-O período de latência do HIV é o período compreendido entre a infecção pelo HIV e os sintomas e sinais que caracterizam a doença causada pelo HIV (AIDS). Sem o uso dos anti retrovirais, dependendo da via de infecção, as medianas desse período estão entre:

A. 5 a 30 dias.
B. 30 a 120 dias.
C. 1 a 3 anos.
D. 3 a 10 anos.
E. 5 a 15 anos.

24-Sobre sífilis congênita é INCORRETO afirmar:

A. É conseqüente da infecção do feto pelo *Treponema pallidum*, por via placentária.
B. A transmissão faz-se no período fetal a partir de 4 a 5 meses de gestação.
C. Antes da fase de transmissão, a membrana celular das vilosidades coriais parece constituir obstáculo intransponível para o Treponema.
D. Após a passagem transplacentária, o treponema ganha os vasos do cordão umbilical e se multiplica rapidamente em todo o organismo fetal.
E. O quadro mais freqüente de comprometimento cardiovascular é a aortite sifilítica (determinando insuficiência aórtica), aneurisma e estenose de coronárias.

25-Referente a Coleta de citologia oncótica é INCORRETO afirmar:

A. O espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em mulheres muito jovens, que não tiveram parto vaginal, menopausadas e em mulheres muito magras.
B. O espéculo de tamanho grande pode ser indicado para as mulheres multíparas e para as obesas.
C. Em condições intermediárias ou em caso de dúvida, deve-se utilizar o de tamanho médio.
D. Caso haja dificuldade para visualização do colo, deve-se sugerir que a paciente tussa. Se o profissional não conseguir visualizar o colo, deve pedir auxílio à enfermeira ou ao médico.
E. A paciente não pode estar menstruada, devendo-se, preferencialmente, aguardar o 3º dia após a menstruação.

26-São características de um curativo ideal numa úlcera neurotrófica, EXCETO:

A. Remover o exsudato.
B. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo.
C. Não permitir trocas gasosas.
D. Ser impermeável às bactérias.
E. Fornecer isolamento térmico.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

27-Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios poderão receber os recursos federais por meio de cinco blocos de financiamento que NÃO inclui:

A. Atenção Básica.
B. Atenção de Média e Alta Complexidade.
C. Vigilância Ambiental.
D. Assistência Farmacêutica.
E. Gestão do SUS.

28-O SINITOX é o:

A. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Alimentares.
B. Sistema Estadual de Informações Tóxico-Alimentares.
C. Sistema Municipal de Informações Tóxico-Alimentares.
D. Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas.
E. Sistema Estadual de Informações Tóxico-Farmacológicas.

29-O Plano de Saúde consolida, em cada esfera de governo, o processo de planejamento na área da saúde, sendo um instrumento de, EXCETO:

A. Transferência de recursos.
B. Clientelismo político.
C. Fiscalização por parte do Ministério da Previdência Social (MPAS).
D. Controle por parte do Ministério da Saúde.
E. Orientação das ações no campo sanitário.

30-As características principais da secreção vaginal normal são, EXCETO:

A. pH ácido - 2,0 a 3,5.
B. Mais abundante no período ovulatório, gestação, ou quando há excitação sexual.
C. Coloração clara ou ligeiramente castanha.
D. Aspecto mucoso, flocular ou grumoso.
E. Ausência de odor desagradável.

31-"Caracteriza- se pela redução da luz brônquica por secreção em brônquios de pequeno calibre ou broncoespasmo (Ex: Asma)". Das alternativas abaixo, indique aquela que apresenta o tipo de estertores descrito no texto.

A. Cornagem
B. Ronco
C. Sibilo
D. Creptante
E. Bolhoso

32-A acidose metabólica pode resultar da (o), EXCETO:

A. Incapacidade dos rins de excretarem os ácidos metabólicos normalmente formados no organismo.
B. Formação de quantidades excessivas de ácidos metabólicos no organismo.
C. Administração venosa de ácidos metabólicos.
D. Acréscimo de ácidos metabólicos por absorção do tubo gastrintestinal.
E. Secreção de quantidades excessivas pelas glândulas supra-renais de aldosterona.

33-São complicações comumente relatadas da veia jugular interna (VJI), EXCETO:

A. Punção acidental de carótida, formação de hematomas.
B. Punção acidental de traquéia, lesão de nervo recorrente laríngeo.
C. Embolia aérea, pneumotórax.
D. Quilotórax (especialmente nas punções do lado esquerdo).
E. Trombose, flebite, sépse.

34-Em surtos pode-se confirmar a hepatite A também por vínculo epidemiológico, depois que um ou dois casos apresentaram anticorpos anti-HAV da classe:

A. IgA
B. IgB
C. IgE
D. IgG
E. IgM

35-É uma anemia de origem adquirida:

A. Síndrome de Crosby.
B. Síndrome de Rundles Falls.
C. Síndrome de Dresbach.
D. Síndrome de Evans (associada a púrpura trombocitopênica).
E. Síndrome de Minkowski-Chaufard-Gaensslen.

36-Para o acompanhamento das crianças desnutridas é necessário organizar um calendário especial de atendimento, no qual devem ser observados os seguintes pontos, EXCETO:

A. Para crianças menores de 2 anos, o intervalo máximo entre os atendimentos é de 60 dias; para crianças maiores de 2 anos, o intervalo máximo entre os atendimentos é de 90 dias.
B. As crianças mais graves deverão ser atendidas em intervalos menores - quinzenalmente ou semanalmente, se necessário.
C. Os atendimentos individuais devem ser intercalados com os atendimentos de grupo e com as atividades educativas e de promoção à saúde.
D. À medida que a criança for se recuperando, os atendimentos poderão ser mais espaçados.
E. O acolhimento do desnutrido e o atendimento não-programado em situações emergenciais devem ser garantidos, ainda que não haja agendamento, lembrando-se de que a desnutrição é sempre uma condição de elevado risco para doenças infecto-contagiosas.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

37- O acordo com o Pacto Pela Saúde 2006 deve ser firmado entre os gestores das 3 esferas do SUS a partir de, EXCETO:

A. Reforço da organização das regiões sanitárias instituindo mecanismos de co-gestão e planejamento regional.
B. Fortalecimento do controle social (espaços e mecanismos).
C. Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde.
D. Redefinição dos instrumentos de regulação programação e avaliação.
E. Valorização da cooperação técnica entre os gestores e financiamento bipartíte (estimula critérios de equidade nas transferências fundo a fundo).

38-Respiração profunda seguida de agônica ou estertorosa:

A. Biot.
B. Cheynes-Stockes.
C. Estertor.
D. Kussmaul.
E. Ortopnéia.

39-São funções do Colegiado de Gestão Regional no SUS (Constituição, Organização e Funcionamento), EXCETO:

A. Apoiar e aprimorar o Planejamento local.
B. Priorizar linhas de investimento.
C. Estimular estratégias de qualificação do controle social.
D. Atualizar e acompanhar a programação pactuada e integrada da atenção à saúde.
E. Constituir um processo dinâmico de avaliação e monitoramento regional.

40-São métodos comuns de desinfecção, EXCETO:

A. Substâncias químicas.
B. Aquecimento.
C. Radiação ultravioleta.
D. Água fervente.
E. Vapor.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br